


### LAURENTIDES - DONNÉES DE 2022

Les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) sont à la hausse au Québec et dans les Laurentides. La pandémie de COVID-19 a ralenti en apparence leur croissance en 2020 et 2021, mais le portrait de 2022 démontre une remontée de l'incidence des déclarations des ITSS. Avec 2 394 cas déclarés en 2022 dans les Laurentides, les ITSS comptent pour 83 % de l'ensemble des infections déclarées au système des Maladies à déclaration obligatoire (MADO).

### INFECTION GONOCOCCIQUE : AUGMENTATION DES CAS


#### Les tendances

- Taux d'infection gonococcique déclaré dans la région des Laurentides : remontée en 2022, rejoint presque le sommet de 2019.
- 368 cas d'infection gonococcique déclarés en 2022.



- Les taux sont plus élevés chez les hommes que les femmes.
- En 2022, c'est chez le groupe des 20-24 ans que le taux d'incidence est le plus haut chez les hommes et les femmes. On retrouve également un taux particulièrement élevé chez les hommes de 25 à 29 ans.
- Les taux élevés chez les femmes soulèvent une grande préoccupation en raison du risque de conjonctivite gonococcique néonatale.
- Les taux chez les jeunes de 15-19 ans tous sexes confondus semblent bien moins élevés que les 20-24 ans ce qui soulève la question à savoir s'ils sont bien rejoints par les cliniques jeunesse et les services médicaux.

Taux d'incidence des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe et l'âge, région des Laurentides, 2022



### La gonorrhée et la résistance aux antibiotiques : un phénomène réel et inquiétant


Taux de résistance des antibiotiques pour les souches testées au Laboratoire de santé publique du Québec en 2021 :

	Laurentides	Ensemble du Québec
Ciprofloxacine	39 %	50,4 %
Azithromycine	18 %	39 %


Source : Communication personnelle Brigitte Lefebvre, Ph.D., LSLPQ.

On rappelle l'importance de faire des cultures pour la gonorrhée lorsque c'est cliniquement indiqué.

## SYPHILIS INFECTIEUSE : PRÉSENCE PRÉOCCUPANTE CHEZ LES FEMMES EN ÂGE DE PROCRÉER



- Le taux de syphilis infectieuse remonte après la baisse observée en 2020 durant la première année de pandémie de COVID-19. Le taux de 2022 a presque rejoint le sommet de 2019, comme dans l'ensemble du Québec.
- La région présente encore en 2022 un taux d'incidence de syphilis infectieuse inférieur à celui du Québec et la courbe de tendance de la région suit celle du Québec.
- Il y a eu 52 cas déclarés de syphilis infectieuses en 2022.



- En 2022, les taux sont essentiellement plus élevés chez les hommes que chez les femmes, sauf pour les 15 à 24 ans.
- Il est préoccupant d'observer la présence de la maladie chez les femmes en âge de procréer, en raison du risque de syphilis congénitale.


Au Québec, on note une augmentation progressive du taux chez les femmes de 15-49 ans. Hausse récente de +34 % en un an entre 2021 et 2022.

- \* Rappel concernant le dépistage de la syphilis chez la femme enceinte :
  - À effectuer lors du bilan prénatal de base.
  - À répéter, au besoin plus d'une fois, mais au minimum une fois vers la 28<sup>e</sup> semaine de grossesse et au moment de l'accouchement, en présence d'une exposition, de comportements à risque chez la femme enceinte ou chez son partenaire.

## Guide d'usage optimal (GUO) sur la syphilis, mise à jour avril 2023


L'institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a publié une mise à jour du [Guide d'usage optimal \(GUO\) sur la syphilis](#), qui porte notamment sur le repérage, le diagnostic, l'usage optimal des antibiotiques et le suivi de la syphilis.

## INFECTION À CHLAMYDIA : TOUJOURS LA PLUS FRÉQUENTE




- L'infection à *Chlamydia trachomatis* (CT) est encore l'ITSS la plus fréquente avec 1890 cas déclarés dans les Laurentides en 2022.
- Bien que les taux augmentent en 2022, ceux-ci demeurent en deçà des taux pré-pandémiques. Compte tenu de la hausse générale des autres ITSS, il serait surprenant que cette tendance à la baisse puisse être expliquée par une diminution du nombre de dépistages comme ce fût le cas en 2020 et 2021.
- L'infection est encore majoritairement détectée chez les femmes : 2 cas sur 3 se retrouvent encore chez celles-ci.
- Plus de la moitié des cas sont encore dépistés chez les 15 à 24 ans.

### Proportion des cas de chlamydia de 15 à 24 ans, 2022



## HÉPATITE C : PEU DE DÉCLARATIONS EN 2022

Évolution du taux d'incidence de cas déclarés d'hépatite C dans la région des Laurentides et l'ensemble du Québec



- Les taux de déclarations d'hépatite C dans les Laurentides sont en baisse depuis 2015 et ils sont plus faibles que dans l'ensemble du Québec.
- En 2022 : seulement 5 cas déclarés.
- Âge moyen des cas en 2022 : 53 ans.
- Il faudra obtenir plus de données dans l'avenir afin de préciser le tableau de cette infection.
- Par contre les défis diagnostiques de cette maladie sont bien connus et sont liés au caractère asymptomatique de l'infection, et au fait qu'elle touche plusieurs clientèles vulnérables difficiles à rejoindre.
- Les traitements actuels sont hautement efficaces. Ils permettent de guérir plus de 95 % des personnes atteintes, mais le dépistage de l'infection demeure un défi.


## LYMPHOGRANULOMATOSE VÉNÉRIENNE (LGV)

- Le nombre de cas de lymphogranulomatose vénérienne (LGV) varie entre 0 et 5 par année dans la région des Laurentides.
- Nous observons une recrudescence des déclarations en 2022, dans notre région comme au Québec. On note que tous les cas sont de sexe masculin, et que la moyenne d'âge des cas en 2022 est de 40 ans.
- La LGV touche encore majoritairement les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HARSAH).

## HÉPATITE B : TAUX PLUS BAS QUE DANS L'ENSEMBLE DU QUÉBEC

- Les taux de déclaration d'hépatite B dans notre région sont plus bas que ceux du Québec.
- En 2022, 62,5 % des cas d'hépatite B étaient de sexe masculin pour 37,5 % de sexe féminin.
- La moyenne d'âge de cas en 2022 est de 49 ans.
- Sur un total de 24 cas d'hépatite B déclarés dans les Laurentides en 2022, 4 % étaient des infections aiguës, 42 % chroniques et 54 % sans précision.

Évolution du taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B dans la région des Laurentides et l'ensemble du Québec




## VIH

- Depuis 2002, le Programme de surveillance de l'infection par le VIH de l'INSPQ fournit des données sur les cas confirmés d'infection par ce virus.
- Le VIH est une MADO uniquement si la personne a donné ou reçu du sang, des produits sanguins, des organes ou des tissus. Par contre, tous les cas diagnostiqués sont comptabilisés par l'INSPQ.
- Même s'il ne s'agit pas d'une MADO, la DSPublique offre le soutien aux cliniciens qui désireraient de l'aide dans le soutien à l'intervention préventive auprès des personnes atteintes d'une infection par le VIH et auprès de leurs partenaires. (IPPAP-VIH).
- Dans les Laurentides, il y a eu 17 cas de VIH déclarés en 2022. Sur ce nombre, il y avait 47 % de nouveaux cas, proportion similaire à l'ensemble du Québec (46 %).

## À RETENIR

- Il est important de poursuivre nos efforts de dépistage ITSS auprès des jeunes et des adultes à risque ITSS. Il faudra aussi intensifier les efforts pour les 15-19 ans qu'on ne semble pas rejoindre.
- L'infection gonococcique : Augmentation significative du nombre de cas. Nous encourageons les cliniciens à dépister tous les sites exposés, à effectuer des cultures et à traiter selon le Guide d'usage optimal de l'INESSS : [Guide d'usage optimal - Infection non compliquée à Chlamydia trachomatis ou à Neisseria Gonorrhoeae \(inesss.qc.ca\)](#).




- Infection à Chlamydia : Les femmes demeurent les plus touchées par les complications : dont l'infertilité, l'infection pelvienne et la grossesse ectopique.
- Syphilis : Hausse marquée de cette maladie, inquiétude particulière chez les femmes en âge de procréer. Les symptômes de cette ITSS peuvent facilement passer inaperçus et l'infection causer de graves complications à long terme si elle n'est pas dépistée et traitée.
- Nous encourageons les cliniciens à offrir un dépistage pour la syphilis à leurs patients présentant un ou des facteurs de risque identifiés dans le document suivant : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-308-03W.pdf>.

## ACTIVITÉS DE FORMATION ORGANISÉES PAR LA DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DES LAURENTIDES EN 2022 ET 2023


- Webinaire sur la gonorrhée par Dr Sébastien Poulin microbiologiste disponible en ligne : [Webinaire Direction santé publique | La gonorrhée, évitons les échecs! - YouTube](#)
- Webinaire par Dr Sébastien Poulin microbiologiste disponible en ligne : [Syphilis 101 : Mise à jour sur un problème « vieux comme le monde » - YouTube](#)

## FORMATIONS SUR LES ITSS, INSPQ - FMOQ

- [Modules de formation médicale continue sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang \(ITSS\) : mieux prévenir et mieux traiter | Institut national de santé publique du Québec \(inspq.qc.ca\)](#)



## LANCEMENT DU WEBINAIRE DE L'INESSS SUR LA SYPHILIS



L'INESSS a rendu disponible le 14 décembre 2023 un webinaire sur la syphilis pour faciliter l'appropriation des connaissances véhiculées dans la nouvelle version de son guide d'usage optimal publié au printemps 2023.

Ce webinaire présente une série de cas cliniques où les repères clés et les recommandations du guide sont abordés par deux experts en infections transmissibles sexuellement.

Voici le lien pour la formation : [INESSS: Lancement du webinaire sur la syphilis - Rehausser vos connaissances en 50 minutes.](#)