



BOBO,

MICROBES...

et cie!

Vol. 24 No 4, septembre 2019



DES CHANGEMENTS AU CALENDRIER DE VACCINATION DES ENFANTS

Le calendrier de vaccination des enfants a été modifié dans le but, entre autres, de réduire le nombre d'injections et de visites. Ce nouveau calendrier protège aussi bien les enfants que l'ancien. De plus, il les protège plus rapidement contre la varicelle et il les protège aussi contre l'hépatite A.

Le nouveau calendrier est appliqué pour les enfants nés à partir du 1^{er} juin dernier. Les enfants nés avant le 1^{er} juin continueront à suivre l'ancien calendrier, sauf pour la vaccination contre la varicelle qui sera administrée dès l'âge de 12 mois au lieu de 4 à 6 ans.

Le nouveau calendrier

- La visite de 6 mois a été éliminée; à moins de problèmes de santé particuliers, plus aucun vaccin n'est donné à cet âge.
- La dose du vaccin contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et l'*Haemophilus Influenzae* de type b (DCaT-VPI-Hib), qui était donnée à 6 mois, est maintenant donnée à 12 mois.
- Une première dose du vaccin contre la varicelle est dorénavant offerte à l'âge de 12 mois. Il est combiné aux vaccins contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO-Var).
- La vaccination contre le méningocoque est reportée de l'âge de 12 à 18 mois.
- La vaccination contre l'hépatite A est ajoutée à l'âge de 18 mois en utilisant le vaccin combiné contre l'hépatite A et l'hépatite B (HAHB). Ceci permet de compléter la vaccination contre l'hépatite B administrée à 2 et 4 mois et de protéger contre l'hépatite A.
- La dose de DCaT-HB-VPI-Hib qui était donnée 18 mois a été éliminée.

Avantages

- Retrait de la visite de 6 mois.
- Diminution du nombre d'hospitalisations pour varicelle entre 1 et 2 ans puisqu'une dose du vaccin contre la varicelle est ajoutée à 12 mois.
- Protection contre l'hépatite A par la vaccination des jeunes enfants contre cette maladie à 18 mois.
- Un seul vaccin (dcaT-VPI) donné entre 4 et 6 ans car la dose du vaccin contre la varicelle est maintenant donnée à 12 mois.

Inconvénients

Trois vaccins au lieu de 2 sont administrés à 18 mois.

Pour plus d'information, consultez le site Web unifié du Gouvernement du Québec au :

www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/programme-quebecois-d-immunisation/#c24017



Les principaux symptômes et complications des maladies qu'on prévient par la vaccination

La maladie	Les symptômes	Les complications
Diphthérie	Maux de gorge importants, forte fièvre, problèmes respiratoires.	Problèmes cardiaques, paralysie, décès.
Coqueluche	Difficulté à manger, à boire et à respirer. Violentes quintes de toux qui peuvent provoquer des vomissements ou de l'étouffement. Elles durent plusieurs semaines.	Otites, pneumonies, convulsions, dommages au cerveau (1/11 000), décès (surtout avant l'âge de 3 mois).
Tétanos	Spasmes douloureux des muscles de la mâchoire, des cordes vocales et de tout le corps.	Problèmes respiratoires et cardiaques, décès.
Polio	Fièvre, malaises généraux, nausées, vomissements, douleurs musculaires intenses.	Problèmes respiratoires, paralysie des bras et des jambes pouvant devenir permanente, décès.
Haemophilus influenzae type b	Épiglottite (enflure importante de la gorge), méningite, pneumonie.	Surdit�, retard mental, décès.
Hépatite A	Fièvre, fatigue, perte d'appétit, jaunisse, maux de tête.	Atteinte grave du foie, fatigue durant plusieurs semaines, décès (surtout chez les personnes âgées de 60 ans et plus).
Hépatite B	Fièvre, maux de ventre, jaunisse, vomissements.	Atteinte grave du foie, infection chronique du foie, cirrhose, cancer du foie, décès.
Rotavirus	Diarrhée, vomissements, fièvre.	Déshydratation.
Pneumocoque	Otite, sinusite, pneumonie, infection du sang, méningite.	Surdit�, dommages au cerveau, décès.
Rougeole	Toux, fièvre, yeux rouges, rougeurs sur la peau, atteinte de l'état général.	Otite, pneumonie, convulsions, dommages permanents au cerveau, décès.
Rubéole	Rougeurs sur la peau, enflure des ganglions, arthrite surtout chez les femmes.	Infection du cerveau, malformations chez le bébé dont la mère a eu la rubéole pendant la grossesse, fausse couche.
Oreillons	Fièvre, maux de tête, enflure des glandes près de la mâchoire.	Méningite, surdit�, infection des testicules ou des ovaires.
Varicelle	Fièvre, petites vésicules sur la peau qui forment une croûte et sèchent, démangeaisons.	Otite, infection d'une vésicule (ex. : impétigo), infection grave (ex. : bactérie mangeuse de chair), pneumonie, infection du cerveau, malformations chez le bébé dont la mère a fait la varicelle pendant la grossesse, décès.
Méningocoque	Forte fièvre, maux de tête importants, nausées, vomissements, atteinte de l'état général, rougeurs ou bleus sur la peau.	Dommages permanents au cerveau, amputation des mains ou des pieds, décès.

Pour plus d'information, consultez les *Feuilles d'information pour les personnes à vacciner* du ministère de la Santé et des Services sociaux au : publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002057/