

LIMITER LES FORMULATIONS D'OPIOÏDES À CONCENTRATION ÉLEVÉE ET À DOSE TOTALE ÉLEVÉE



FICHE SYNTHÈSE POR

Ce que la POR dit...

Les gestionnaires de l'établissement mettent en œuvre une stratégie d'atténuation des risques pour réduire les préjudices évitables liés aux opioïdes en limitant la disponibilité des formulations d'opioïdes à concentration élevée et à dose totale élevée et leur accès.

Ce que la POR exige

Respect des 5 tests de conformité suivants :

1. Les gestionnaires de l'établissement s'assurent que les équipes cliniques suivent la procédure de l'établissement pour limiter la disponibilité des formulations d'opioïdes à concentration élevée et à dose totale élevée et leur accès.
2. Les gestionnaires de l'établissement s'assurent que les équipes cliniques suivent la procédure de l'établissement pour limiter la disponibilité des formulations d'opioïdes à concentration élevée et à dose totale élevée et leur accès.
3. Les gestionnaires de l'établissement fournissent aux équipes cliniques une formation continue sur la stratégie d'atténuation des risques de l'établissement pour limiter la disponibilité des formulations d'opioïdes à concentration élevée et à dose totale élevée et leur accès.
4. Les gestionnaires de l'établissement veillent à ce que la liste des formulations d'opioïdes à concentration élevée et à dose totale élevée soit régulièrement mise à jour pour intégrer les enseignements tirés de tous les rapports et analyses d'incidents de sécurité mettant en cause la médication opioïde.
5. Les gestionnaires de l'établissement s'assurent que le plan d'amélioration de la qualité de la gestion du circuit du médicament de l'établissement comprend des activités visant à améliorer les pratiques de sécurité liées à la disponibilité des formulations d'opioïdes à concentration élevée et à dose totale élevée et à leur accès.

Personnel visé

Le département clinique de pharmacie et l'ensemble des professionnels de la santé impliqués dans le volet narcotique du circuit du médicament.



LIMITER LES FORMULATIONS D'OPIOÏDES À CONCENTRATION ÉLEVÉE ET À DOSE TOTALE ÉLEVÉE

En résumé pour être conforme

Ci-dessous des exemples de formulations d'opioïdes à dose totale élevée pour les établissements de soins de courte et de longue durée :

- Ampoules ou flacons de fentanyl dont la dose totale est supérieure à 100 mcg ;
- Ampoules ou flacons d'HYDROMORPHONE dont la dose totale est supérieure à 2 mg ;
- Ampoules ou flacons de morphine avec une dose totale supérieure à 15 mg par formulation dans les établissements de soins pour adultes et à 2 mg dans les établissements de soins pour enfants ;
- Cassettes de perfusion d'opioïdes.

Ci-dessous des exemples de formulations d'opioïdes à concentration élevée pour les établissements de soins de courte et de longue durée :

- Flacons d'HYDROMORPHONE à 50 mg/ml ;
- Flacons de morphine à 50 mg/ml ;
- Concentré de méthadone à usage oral à 10 mg/ml.

Ci-dessous des exemples de distribution de formulations d'opioïdes à volume élevé pour les soins à domicile :

- Comprimé d'HYDROMORPHONE à action prolongée à 30 mg limité au minimum à un approvisionnement d'un mois ;
- Timbre transdermique de fentanyl à 100 mcg/h dans une boîte en carton de 5 timbres ;
- Seringues préremplies contenant chacune 5 mg de morphine dans une enveloppe pour 10 seringues ;
- Solution orale de méthadone à 1 mg/ml en flacons de 100 ml.

Exemple

Selon MSI : « Cadre de référence sur l'administration par voie sous cutanée » (Intranet)

Maximum par site d'injection 0,5 mL pédiatrie / 1,5 mL chez l'adulte

Par exemple : Administration d'une dose de 10 mg S.Cut. TID PRN

Utiliser : Morphine 10 mg/mL (soit 1 mL par dose)

Ne pas utiliser : Morphine-HP 50 mg/mL (soit 0,2 mL)



Document de référence

