

Echelle révisée de déambulation d'Algase – Soins de longue durée

Elodie MARTIN, Nathalia BIESSY-DALBE, Jean-Michel ALBARET, Donna L. ALGASE

Institut de Formation en Psychomotricité de Toulouse - 133, rte de Narbonne - 31062 Toulouse cedex 9

Nom:.....

Date:.....

Pour chacune des propositions suivantes, entourez le chiffre qui correspond le mieux au comportement de votre patient au cours de la semaine écoulée

1 - Le patient présente une diminution de la marche spontanée

- 1 - ne marche jamais seul sauf si on l'y incite
- 2 - marche le minimum, par exemple pour aller à la salle de bain
- 3 - marche moins que les autres patients du même âge et ayant les mêmes capacités
- 4 - marche autant ou plus que les autres patients du même âge et ayant les mêmes capacités

7 - Le patient s'enfuit

- 1 - jamais
- 2 - à certaines occasions
- 3 - régulièrement mais pas quotidiennement
- 4 - quotidiennement

2 - Le patient se perd

- 1 - jamais
- 2 - à certaines occasions
- 3 - régulièrement mais pas quotidiennement
- 4 - quotidiennement

8 - Le patient rentre dans des zones non autorisées

- 1 - jamais
- 2 - à certaines occasions
- 3 - régulièrement mais pas quotidiennement
- 4 - quotidiennement

3 - Le patient marche de son propre chef

- 1 - seulement s'il est incité
- 2 - occasionnellement durant la journée
- 3 - fréquemment durant la journée
- 4 - presque constamment durant la journée

9 - Le patient marche sans répit

- 1 - jamais
- 2 - à certaines occasions
- 3 - régulièrement mais pas quotidiennement
- 4 - quotidiennement

4 - Le patient tente de quitter son service

- 1 - jamais
- 2 - à certaines occasions
- 3 - régulièrement mais pas quotidiennement
- 4 - quotidiennement

10 - Le patient va et vient

- 1 - jamais
- 2 - à certaines occasions
- 3 - régulièrement mais pas quotidiennement
- 4 - quotidiennement

5 - Le patient ne peut pas localiser la salle de bain sans aide

- 1 - ne nécessite pas d'aide
- 2 - nécessite parfois de l'aide
- 3 - nécessite souvent de l'aide
- 4 - nécessite toujours de l'aide

11 - Le patient ne peut pas localiser sa propre chambre sans aide

- 1 - ne nécessite pas d'aide
- 2 - nécessite parfois de l'aide
- 3 - nécessite souvent de l'aide
- 4 - nécessite toujours de l'aide

6 - Le patient ne peut pas localiser la salle à manger sans aide

- 1 - ne nécessite pas d'aide
- 2 - nécessite parfois de l'aide
- 3 - nécessite souvent de l'aide
- 4 - nécessite toujours de l'aide

12 - Le patient marche entre le petit déjeuner et le repas du midi

- 1 - jamais
- 2 - moins que les autres patients du même âge et ayant les mêmes capacités
- 3 - autant que les autres patients du même âge et ayant les mêmes capacités
- 4 - plus que les autres patients du même âge et ayant les mêmes capacités

13 - Le patient marche entre le midi et le repas du soir

- 1 - jamais
- 2 - moins que les autres patients du même âge et ayant les mêmes capacités
- 3 - autant que les autres patients du même âge et ayant les mêmes capacités
- 4 - plus que les autres patients du même âge et ayant les mêmes capacités

14 - Le patient marche entre le repas du soir et le coucher

- 1 - jamais
- 2 - moins que les autres patients du même âge et ayant les mêmes capacités
- 3 - autant que les autres patients du même âge et ayant les mêmes capacités
- 4 - plus que les autres patients du même âge et ayant les mêmes capacités

15 - Le patient retourne dans son service après l'avoir quitté sans s'en apercevoir

- 1 - jamais
- 2 - une seule fois
- 3 - plus d'une fois mais pas souvent
- 4 - souvent

16 - Le patient marche entre le lever et le petit déjeuner

- 1 - jamais
- 2 - moins que les autres patients du même âge et ayant les mêmes capacités
- 3 - autant que les autres patients du même âge et ayant les mêmes capacités
- 4 - plus que les autres patients du même âge et ayant les mêmes capacités

17 - Le patient marche sans but

- 1 - il a toujours un but ou une destination identifiable
- 2 - il a souvent un but ou une destination identifiable
- 3 - il a quelquefois un but ou une destination identifiable
- 4 - il n'a jamais un but ou une destination identifiable

18 - Pendant qu'il marche seul, le patient se cogne contre des obstacles ou contre d'autres patients

- 1 - jamais
- 2 - à certaines occasions
- 3 - régulièrement mais pas quotidiennement
- 4 - quotidiennement

19 - Le patient présente une augmentation de la marche spontanée

- 1 - marche environ autant que les autres patients du même âge et ayant les mêmes capacités
- 2 - marche beaucoup plus que la moyenne mais s'assoit par périodes
- 3 - marche beaucoup plus que la moyenne et s'assoit rarement
- 4 - marche beaucoup plus que la moyenne et ne s'assoit jamais

Marche persistante : items n° 1, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19
 Comportement de fugue : items n° 4, 7, 8, 15
 Désorientation spatiale : items n° 2, 5, 6, 11, 17, 18

SCORES	MP (9 items)	CF (4 items)	DS (6 items)
Scores par sous échelle	/36	/16	/24
Moyenne par sous échelle (score/nbre items)	/4	/4	/4
Score total (MP + CF+ DS)	/76		
Moyenne totale	/4		

MP= marche persistante ; CF= comportement de fugue ; DS= désorientation spatiale

Sous-échelles	N	Moyenne (écart type)	
Marche persistante /4	Non déambulants	50	1.79 (0.45)
	Déambulants	50	3.17 (0.60)
Comportement de fugue /4	Non déambulants	50	1.08 (0.34)
	Déambulants	50	2.16 (0.73)
Désorientation spatiale /4	Non déambulants	50	2.07 (1.01)
	Déambulants	50	2.93 (0.80)
Moyenne totale /4	Non déambulants	50	1.74 (0.39)
	Déambulants	50	2.89 (0.52)

Moyenne et écart-type de chaque sous-échelle pour les sujets déambulants et non déambulants (différence significative à $p < 0.01$).