

Guide de priorité pour les demandes d'examens en échographie)

PRIORITÉ 1 (Stat à 24 heures)	
Abdomen	<ul style="list-style-type: none"> • Dissection aortique, rupture d'anévrisme • Traumatisme abdominal majeur, patient instable • Douleur abdominale aiguë chirurgicale (appendicite) • État toxique, suspicion d'abcès • Hémorragie intra abdominale • Infection urinaire recherche d'obstruction
Gynécologie	<ul style="list-style-type: none"> • Saignement 2^e et 3^e trimestre • Cœur fœtal négatif, 2^e ou 3^e trimestre • Douleur abdominale aiguë, recherche de grossesse ectopique post BHCG positive
Surface	<ul style="list-style-type: none"> • Thrombophlébite • Syndrome du compartiment • Thrombose, dissection des vaisseaux du cou • Douleur testiculaire aiguë

PRIORITÉ 2 (2 à 7 jours)	
Abdomen	<ul style="list-style-type: none"> • Préciser l'image de TDM dans bilan métastatique • Recherche d'abcès • Infection urinaire pédiatrique • Recherche d'ascite
Gynécologie	<ul style="list-style-type: none"> • Saignement du 1^{er} trimestre post BHCG positive • Recherche d'abcès • Rétention placentaire
Surface	<ul style="list-style-type: none"> • Traumatisme ligamentaire ou tissus mous aigus AVC sténose carotide • Arthrite aiguë septique

PRIORITÉ 3 (8 à 30 jours)	
Abdomen	<ul style="list-style-type: none"> • Souffle abdominal asymptomatique • Bilan métastatique • Bilan pré greffe • Évaluation d'une anomalie au TDM ou IRM hors contexte néoplasique • Suspicion d'anévrisme de l'aorte asymptomatique • Croissance d'une masse cancéreuse • Hématurie • Bilan hépatique perturbé
Gynécologie	<ul style="list-style-type: none"> • Ménométrorragie • Dating gestationnel • Staging de néoplasie • Saignement post ménopausique • Évaluation de masse annexielle sans contexte gestationnel • Croissance d'une masse cancéreuse
Surface	<ul style="list-style-type: none"> • Déchirure de la coiffe • Tendinite • Souffle carotidien asymptomatique • Masse des tissus mous • Lymphadénie • Thyroïdite • Masse cancéreuse • Masse testiculaire

PRIORITÉ 4 Prochain RV électif dispo – 31 à 90 jours)	
Abdomen	<ul style="list-style-type: none"> • Screening histoire familiale d'anévrisme • Screening cirrhose ou hépatite • Douleurs chroniques • Suivi d'anévrisme • Fièvre d'origine indéterminée
Gynécologie	<ul style="list-style-type: none"> • Screening histoire familiale de néoplasie • Douleurs chroniques
Surface	<ul style="list-style-type: none"> • Kyste de Baker • Mesure des artères poplitées • Nodule thyroïdien • Lipome cutané